



ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги !

Перед Вами первый в 2008 году номер научно-практического рецензируемого журнала для кардиологов и терапевтов «Рациональная фармакотерапия в кардиологии».

В первой статье номера Г.И. Швец и С.В. Поветкин представляют результаты фармакоэпидемиологического исследования приверженности врачей назначению антигипертензивных препаратов. Выявлено частичное несоответствие тактики ведения пациентов современным стандартам лечения артериальной гипертензии.

А.Р. Киселев и соавторы оценили влияние фозиноприла и атенолола на вегетативную регуляцию сердца у больных артериальной гипертензией (АГ) с учетом спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма. Оба препарата оказывают сходное воздействие на центральные механизмы вегетативной регуляции сердца и на общую структуру вариабельности сердечного ритма; при этом атенолол более выражено воздействует на состояние симпатно-парасимпатического баланса.

В статье О.Н. Антроповой и соавторов проведена сравнительная оценка антигипертензивной эффективности небиволола, эналаприла и индапамида, их влияние на массу миокарда и качество жизни у больных стрессовых профессий. Показано, что небиволол имеет ряд преимуществ у больных этой категории.

В исследовании Н.А. Белолипецкого и соавторов изучена клиническая эквивалентность двух препаратов ацетилсалициловой кислоты – оригинального и дженерика – у больных АГ 1-2 степени. Авторы пришли к заключению, что дженерический препарат ацетилсалициловой кислоты терапевтически эквивалентен оригинальному препарату при значительно более низкой стоимости лечения.

Д.С. Кривоносов и коллеги изучили влияние эндovasкулярной реваскуляризации миокарда в комбинации с медикаментозной инотропной стимуляцией и миокардиальной разгрузкой на прогноз больных пожилого и старческого возраста с инфарктом миокарда, осложненным сердечной недостаточностью. Показано, что комбинированное использование чрескожной ангиопластики и левосимендана более эффективно, чем раздельное применение каждого из этих методов в отношении регресса клинических и инструментальных признаков сердечной недостаточности. Статью сопровождает редакционный комментарий.

М.А. Карпенко и соавторы описывают выявленные ими связи между развитием инсульта при АГ и полиморфизмом генов ряда молекул: ангиотензинпревращающего фермента, рецептора ангиотензина II 1 типа, апополипротеина CIII, апопротеина E, метилентетрагидрофолат редуктазы, фибриногена, эндотелиальной NO-синтазы.

Интересные данные представили Ю.А. Васюк и соавторы. При применении тканевой доплерографии у больных АГ регионарные нарушения диастолической функции миокарда выявляются еще до структурно-геометрической перестройки левого желудочка при нормальных параметрах трансмитрального кровотока.

Н.М. Чихладзе и соавторы сравнили антигипертензивный эффект блокатора AT1-ангиотензиновых рецепторов лозартана и ингибитора АПФ эналаприла (в том числе их комбинаций с гидрохлортиазидом). Лозартан и лозартан в комбинации с гидрохлортиазидом продемонстрировали сопоставимую с эналаприлом антигипертензивную эффектив-

ность, а также нефропротективные свойства.

Влияние лизиноприла на микроальбуминурию и эластичность сосудистой стенки у пациентов с эссенциальной АГ было предметом исследования Л.А. Хаишевой и Л.И. Кательницкой. Показано, что у больных АГ лечение лизиноприлом приводит к значимому снижению артериального давления (АД), микроальбуминурии и фатального сердечно-сосудистого риска.

С.А. Смакотина и соавторы изучили влияние метопролола тартрата на АД и когнитивные функции у пациентов молодого и среднего возраста с гипертонической болезнью. Авторы описывают благоприятное влияние на когнитивные функции, что позволило авторам расценивать метопролол не только как эффективный антигипертензивный препарат, но и как средство, обладающее церебропротективным действием.

Е.Д. Голованова показала, что длительная терапия индапамидом и его комбинацией с периндоприлом приводит к уменьшению сосудистого ремоделирования и увеличению вариабельности сердечного ритма при выраженном антигипертензивном эффекте у пациентов с АГ. Терапия метопрололом в низких дозах приводит к гармонизации вегетативного тонуса вне зависимости от антигипертензивного действия препарата.

В статье С.Н. Толпыгиной и соавторов представлены данные сравнения эффектов длительной терапии лозартаном (в том числе и в комбинации с гидрохлортиазидом) и амлодипином на структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и уровень АД у больных АГ.

Л.И. Кательницкая и Л.А. Хаишева изучили половые различия течения АГ и ее лечения. Показано, что нарушения функции эндотелия и эластических свойств артерий у женщин развиваются позже, чем у мужчин, однако после наступления менопаузы темпы прогрессирования этих нарушений у женщин выше.

В рубрике «Точка зрения» С.Ю. Марцевич и Н.П. Кутишенко рассматривают основные показания к назначению статинов, принципы их назначения в свете существующих международных рекомендаций и затрагивают проблему выбора препарата из группы статинов, в том числе проблему эквивалентности препаратов-дженериков оригинальным препаратам.

М.Н. Мамедов и М.В. Строева обсуждают некоторые результаты исследования DREAM (влияние ингибитора АПФ рамиприла на риск развития сахарного диабета у лиц с преддиабетом и низким сердечно-сосудистым риском). В редакционном комментарии представлены обобщенные результаты DREAM, включая эффекты розиглитазона у больных преддиабетом.

В этом номере публикуется первая часть Рекомендаций по лечению АГ Европейского общества кардиологов и Европейского общества по АГ 2007 года.

Краткую информацию по результатам недавно завершившихся исследований представил С.Р. Гиляревский.

Ан.А. Александров комментирует исследование ADVANCE, посвященное предотвращению сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа.

В.В. Якусевич представил материалы симпозиума по диуретикам, проведенного при поддержке секции ВНОК «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии» на Конгрессе кардиологов в октябре 2007 в Москве.

И.В. Поморцева продолжает тему эффективного публичного выступления в недавно открытой рубрике «Практические навыки».

В заключение хотелось бы призвать читателей и авторов к активному сотрудничеству с журналом в наступившем 2008 г.

С уважением,

Главный редактор
Академик РАН, профессор П.Г. Оганов