



ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги !

Перед Вами четвертый номер научно-практического рецензируемого журнала для кардиологов и терапевтов «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии» за 2008 г.

Открывает номер оригинальное исследование Р.Г. Оганова, В.С. Шерашова и соавторов, посвященное изучению патогенетических механизмов и факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии в отдаленном периоде (через 13-20 лет) после катастрофы. Получены данные о наличии у ликвидаторов новых устойчиво действующих во времени факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Статья М.П. Савенкова и соавторов посвящена актуальной, но мало представленной в литературе проблеме – опасности приема алкоголя на фоне антигипертензивной терапии. Показано, что прием алкогольных напитков на фоне активной антигипертензивной терапии сопряжен с повышенным риском развития гипотензивных реакций и дисциркуляторных вестибулярных нарушений.

А.С. Керимкулова и соавторы изучили влияние 12-месячной терапии ловастатином на сосудистое ремоделирование, систолическую и диастолическую функции левого желудочка. Как оказалось, терапия ловастатином наряду с гиполипидемическим эффектом и снижением толщины комплекса интима-медиа сонных артерий приводит к замедлению нарастания индекса массы миокарда и небольшому, но статистически значимому повышению фракции выброса левого желудочка.

Н.Э. Закирова и соавторы оценили роль нарушений вазодилатирующей, вазоконстрикторной и адгезивной функций эндотелия в развитии стенокардии у больных ИБС. Показано, что клиническое течение ИБС связано с нарушениями вазодилатирующей, вазоконстрикторной и адгезивной функций эндотелия.

В.Р. Вебером и соавторами обнаружено, что гипотензивная терапия у больных артериальной гипертензией с абдоминальным типом ожирения в отличие от пациентов с нормальной массой тела даже при достижении целевого уровня АД практически не корректирует диастолическую дисфункцию и не уменьшает массу миокарда левого желудочка.

Е.М. Идрисова и коллеги продемонстрировали благоприятное влияние комбинированной терапии пролонгированными формами верапамила и индапамида на состояние углеводного, липидного и электролитного обменов у больных метаболическим синдромом.

В первой статье рубрики «Актуальные вопросы клинической фармакологии» Н.П. Кутишенко и соавторы обсуждают важный вопрос – экономическую целесообразность назначения дженериков. Во второй статье рубрики О.А. Плейко и А.О. Конради анализируют клиническую и экономическую эффективность различных тактик подбора антигипертензивной терапии в амбулаторных условиях. Показано, что комбинированная терапия с ис-

пользованием фиксированных комбинаций наиболее эффективна и демонстрирует значительные экономические преимущества.

Рубрику «Смежные проблемы кардиологии» открывает статья М.Е. Стаценко и И.А. Тыщенко. Авторы показали, что включение антидепрессанта пирлиндол в состав комбинированной терапии при лечении больных пожилого возраста с ХСН в постинфарктном периоде эффективно устраняет психосоматические расстройства, характеризуется хорошей переносимостью и приводит к достоверному улучшению морфофункциональных параметров сердца и снижению активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.

А.А. Кириченко и З.М. Танкиева представляют исследование эффективности и переносимости антигипертензивной терапии эналаприлом и дилтиаземом у женщин в постменопаузе с АГ и климактерическими расстройствами. Авторы обращают внимание на необходимость учитывать наличие климактерических расстройств у женщин в постменопаузе и весь спектр терапевтических эффектов применяемых лекарственных средств.

В.В. Якусевич и соавторы изучили реокорректирующие свойства препарата Гинкго Билоба и сопоставили их с клиническими эффектами у пожилых пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне контролируемой артериальной гипертензии. Обнаружено, что препарат улучшает оксигенацию головного мозга за счет повышения текучести крови в микроциркуляторном русле.

В завершающей рубрику статье М.Н. Мамедов и О.М. Драпкина рассматривают вопрос о назначении антигипертензивной терапии у больных с хроническими заболеваниями печени.

В рубрике «Точка зрения» рассмотрены актуальные вопросы снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, роль блокаторов ангиотензиновых рецепторов и бета-адреноблокаторов в терапии артериальной гипертензии и значение D-димера как фактора риска артериальных тромбозов.

С.А. Бойцов и И.П. Колос проводят анализ имеющейся доказательной базы и делают вывод, что блокаторы ангиотензиновых рецепторов могут безопасно и эффективно применяться в широкой клинической практике для увеличения продолжительности и качества жизни у пациентов с АГ.

С.Ю. Марцевич анализирует современные возможности снижения риска сердечно-сосудистых осложнений с помощью лекарственной терапии.

Н.В. Фурман и соавторы рассматривают проблему оценки риска артериальных тромбозов. Обсуждается, может ли D-димер использоваться для оценки риска и эффективности медикаментозного лечения.

В статье Л.Н. Малай обсуждается правомочность применения β -адреноблокаторов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Анализируются результаты крупных исследований с использованием этой группы препаратов.

В этом номере журнала публикуется окончание Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике 2007 года.

С.Ю. Марцевич представляет интересную информацию о прошедшем в сентябре 2008 г. Конгрессе Европейского общества кардиологов.

В заключение хотелось бы призвать авторов к активному сотрудничеству.

С уважением,

Главный редактор
Академик РАМН, профессор Р.Г. Оганов