



ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги !

Перед Вами пятый, завершающий 2008 год номер научно-практического рецензируемого журнала для кардиологов и терапевтов «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии».

Открывает номер оригинальное исследование А.И. Попугаева и соавторов, посвященное оценке качества контроля артериальной гипертензии (АГ) в Вологодской области. Показано, что в городе чаще к врачам обращаются больные с 1-й степенью АГ, на селе – с 3-й степенью. Больные АГ на селе достоверно чаще принимают антигипертензивные препараты, имеют большую частоту факторов риска и ассоциированных состояний, влияющих на общий сердечно-сосудистый риск.

Рубрику «Оригинальные исследования» открывает статья И.В. Подсонной и соавторов, которая посвящена состоянию когнитивных функций у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и возможностям их коррекции нейрорепаративным препаратом кортексин. Продемонстрированы преимущества двухкурсового применения препарата.

С.Ю. Марцевич и соавторы изучили влияние дополнительного назначения бетагистина дигидрохлорида к терапии ингибитором АПФ при симптомах головокружения у больных ХСН II-III ФК. Показано, что достижение целевой дозы ингибитора АПФ возможно более чем у 90% больных ХСН II-III ФК без возникновения симптомов гипотонии. Дополнительное назначение бетагистина дигидрохлорида необходимо при остающихся симптомах головокружения после достижения целевой дозы ингибитора АПФ.

С.Н. Толпыгина и С.Ю. Марцевич сравнили гиполипидемическую эффективность и безопасность дженерического и оригинального симвастатина, показали терапевтическую эквивалентность препаратов.

В статье И.И. Синициной и соавторов изучено влияние монотерапии рамиприлом или молсидоминном, а также их комбинации на морфофункциональные показатели сердца и клинический статус больных ХСН II-III ФК. Обнаружено, что все три вида терапии клинически и гемодинамически эффективны при длительном лечении больных ХСН II-III ФК и постинфарктным кардиосклерозом.

С.Ю. Марцевич и коллеги представляют предпосылки, цели и задачи исследования КАМЕЛИЯ, в котором сравнивается терапия карведилолом и метопрололом у больных АГ и избыточной массой тела/ожирением.

Т.В. Адашева и соавторы продемонстрировали высокую антигипертензивную эффективность, органопротективное действие и безопасность применения амлодипина малеата у больных АГ в сочетании с ХОБЛ, а также возможности препарата в подавлении системного воспаления и снижении интенсивности оксидативного стресса.

Возможность достижения целевого уровня ЧСС при двух способах назначения метопролола сукцината пролонгированного действия, отличающихся по начальной дозе препарата (50 или 100 мг), у больных ишемической болезнью сердца со стабильной стенокардией – предмет исследования С.Н. Толпыгиной и С.Ю. Марцевича. Обнаружено, что применение метопролола в дозе 200 мг/сутки обеспечивает более эффективный контроль ЧСС у больных ИБС по сравнению с дозой 50-100 мг при хорошей переносимости лечения.

В.М. Царева и соавторы показали, что у больных АГ амлодипин повышает эффективность микроциркуляции, уменьшает негетерогенность процессов реполяризации, способствуя стабильности электрофизиологических свойств миокарда. Амлодипин положительно влияет на структурно-функциональные показатели состояния сердца, приводит к снижению систолического и диастолического АД и уменьшению показателей нагрузки давлением в течение суток.

Влияние монотерапии нифедипином-ретард и амлодипином на вариабельность сердечного ритма у пожилых больных АГ с различной скоростью биологического старения изучено Е.Д. Головановой и Т.В. Осиповой. Показано, что монотерапия антагонистами кальция II-III поколения оказывает положительное влияние на вегетативный тонус при достижении целевых уровней АД.

Рубрику «Актуальные вопросы клинической фармакологии» открывает работа И.О. Торшина и О.А. Громовой. Авторы обсуждают механизмы воздействия оротатной кислоты и оротата магния на сердечно-сосудистую систему и терапевтическое значение применения оротата магния в кардиологии.

Во второй статье рубрики М.Ю. Гиляров рассматривает различные аспекты клинического применения добутамина.

Рубрика «Смежные проблемы кардиологии» представлена статьей Д.А. Поддубного и А.П. Реброва, посвященной роли системного воспаления и дисфункции эндотелия как факторов кардиоваскулярного риска у больных анкилозирующим спондилитом.

В рубрике «Точка зрения» М.В. Сура представляет обзор клинических и клинико-экономических исследований, а также результаты собственного сравнительного анализа стоимости применения метопролола тартрата и метопролола сукцината у пациентов с ИБС. В.В. Фомин обсуждает механизмы развития почечного поражения при сердечно-сосудистых заболеваниях, главным из которых является эндотелиальная дисфункция, и подходы к предупреждению поражения почек и сердечно-сосудистых осложнений с фокусом на использование блокаторов рецепторов ангиотензина II.

В этом номере журнала публикуется универсальное определение инфаркта миокарда 2007 г., разработанное совместно ESC/ACCF/ANA/WHF.

С.Ю. Марцевич представляет Новости конгресса Американской кардиологической ассоциации (Новый Орлеан, США, ноябрь 2008 г.).

В заключение поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом и желаю здоровья, благополучия и творческих успехов!

С уважением,

Главный редактор
Академик РАМН, профессор П.Г. Оганов