ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Госпитальные исходы инфаркта миокарда у пациентов, постоянно получающих прямые пероральные антикоагулянты

Чашин М. Г.^{1,2*}, Горшков А. Ю.¹, Драпкина О. М.¹

¹Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, Москва, Россия

²Городская клиническая больница им. В. П. Демикова, Москва, Россия

Цель. Оценить клиническое течение инфаркта миокарда (ИМ) и его госпитальные исходы у пациентов, получающих постоянную терапию прямыми пероральными антикоагулянтами (ПОАК).

Материал и методы. В анализ включены данные 390 пациентов (средний возраст 64,1±12,8 лет), получивших лечение по поводу ИМ. Большинство составляли мужчины 61,5% (n=240). Всем больным выполнялся стандартный объем диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, включая коронароангиографию и чрескожные коронарные вмешательства по показаниям. Проанализированы клинико-anamnestические данные, результаты лабораторных исследований (в т.ч. уровень С-реактивного белка, тропонина I, гемостазиограмма). Изучено клиническое течение ИМ в госпитальном периоде, летальность и частота развития осложнений.

Результаты. Пациенты были разделены на две группы, в основную группу вошёл 41 пациент с постоянным приемом ПОАК, а в контрольную группу – 349 пациентов, не получающих ПОАК. Пациенты 65 лет и старше составляли 68,3% (n=28) основной группы (p=0,0033), среди них отмечалась большая доля лиц, перенесших нарушения мозгового кровообращения и венозные тромбозы (p<0,01). Фибрилляция предсердий (ФП) ранее диагностирована у 75,6% (n=31) больных основной группы (p<0,0001). ИМ с подъемом ST (ИМnST) зарегистрирован в 39,0% (n=16) случаев в основной группе, и в 47,3% (n=165) случаев – в контрольной (p=0,3161). 85,4% (n=35) пациентов основной группы относились к категории высокого госпитального риска по шкале GRACE 1.0, тогда как в контрольной группе 50,4% (n=176) (p<0,0001). По выраженности явлений недостаточности кровообращения обе группы значительно не различались (p=0,1549). Возврат сегмента ST к изолинии на электрокардиограмме при поступлении в стационар регистрировался у 43,8% (n=7) пациентов основной группы и у 18,1% (n=30) группы контроля (p=0,0238). По тяжести поражения коронарного русла и характеру антеградного кровотока в инфаркт-связанной артерии больные обеих групп оказались сопоставимы (p>0,05). Предшествующий прием ПОАК не оказывал значимого влияния на частоту развития желудочно-кишечных кровотечений в госпитальном периоде – отношение шансов (ОШ) 3,96 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,76–20,66), а также на уровень летальности ОШ 1,47 (95% ДИ 0,37–5,85).

Заключение. У пациентов с ИМ, получающих постоянную терапию ПОАК, статистически значимо чаще регистрировался возврат сегмента ST к изолинии при поступлении в стационар, по сравнению с пациентами не получавшими ПОАК. Прием ПОАК не оказывал значимого влияния на летальность и частоту развития осложнений в госпитальном периоде течения ИМ.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, прямые пероральные антикоагулянты, терапия антикоагулянтами.

Для цитирования: Чашин М. Г., Горшков А. Ю., Драпкина О. М. Госпитальные исходы инфаркта миокарда у пациентов, постоянно получающих прямые пероральные антикоагулянты. *Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии*. 2023;19(5):452-460. DOI:10.20996/1819-6446-2023-2962. EDN FXCKDI

Inhospital outcomes of myocardial infarction in patients receiving direct oral anticoagulants

Chashchin M. G.^{1,2*}, Gorshkov A. Yu.¹, Drapkina O. M.¹

¹National Research Center for Therapy and Preventive Medicine, Moscow, Russia

²Demikhov City Clinical Hospital, Moscow, Russia

Aim. To evaluate the clinical course and inhospital outcomes of myocardial infarction (MI) in patients receiving continuous direct oral anticoagulant (DOAC) therapy.

Material and methods. Data from 390 patients treated for MI were included in the analysis. The mean age was 64.1±12.8 years. The majority were men (61.5%; n=240). All patients underwent standard diagnostic and therapeutic procedures according to clinical guidelines, including coronary angiography and percutaneous coronary intervention when indicated. Clinical, anamnestic and laboratory data (including C-reactive protein level, troponin I, coagulation test) were analysed. The inhospital course of MI, mortality and incidence of complications were evaluated.

Results. Patients were divided into two groups according to DOAC therapy received. The main group included 41 patients with constant DOAC intake, while the control group consisted of 349 patients not receiving DOAC. Patients aged 65 years and older accounted for 68.3% (n=28) of the main group (p=0,0033), with a high proportion of cerebral circulation disorders and venous thrombosis (p<0,01). Atrial fibrillation was diagnosed in 75.6% (n=31) of patients in the main group (p<0,0001). ST elevation MI (STEMI) was seen in 39.0% (n=16) of cases in the main group and 47.3% (n=165) of cases in the control group (p=0,3161). As a result, 85.4% (n=35) of patients in the main group had a high GRACE-1 risk, compared to 50.4% (n=176) in the control group (p<0,0001). The two groups did not differ significantly in the severity of heart failure (p=0,1549). ST-segment resolution on admission electrocardiogram was observed in 43.8% (n=7) of the main group and 18.1% (n=30) of the control group (p=0,0238). According to coronary involvement severity and the type of antegrade flow in the infarct-related artery, patients in both groups were comparable (p>0,05). Prior DOAC administration had no significant effect on the incidence of gastrointestinal bleeding (odds ratio (OR), 3.96 (95% Confidence Interval (CI) 0.76–20.66)) and mortality (OR 1.47 (95% CI 0.37–5.85)) during hospitalization.

Conclusion. Patients with MI who received continuous DOAC therapy had significantly more frequent ST-segment resolution at hospital admission compared with patients who did not receive DOAC. DOAC administration had no significant effect on mortality and incidence of inhospital complications of MI.

Keywords: myocardial infarction, direct oral anticoagulants, anticoagulant therapy, DOAC.

For citation: Chashchin M. G., Gorshkov A. Yu., Drapkina O. M. Inhospital outcomes of myocardial infarction in patients receiving direct oral anticoagulants. *Rational Pharmacotherapy in Cardiology*. 2023;19(5):452-460. DOI:10.20996/1819-6446-2023-2962. EDN FXCKDI

*Corresponding Author (Автор, ответственный за переписку): dr.chashchin@gmail.com

Received/Поступила: 11.09.2023

Review received/Рецензия получена: 16.10.2023

Accepted/Принята в печать: 07.11.2023

Введение

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из ведущих причин смерти населения развитых и развивающихся стран [1]. Несмотря на широкое применение ингибиторов агрегации тромбоцитов для профилактики тромботических осложнений, риск развития инфаркта миокарда (ИМ) по-прежнему остается высоким [2].

В остром периоде ИМ происходит нарушение коагуляционного гомеостаза, которое сопровождается тромбозом коронарных артерий [3]. Это может привести к неполной обструкции или окклюзии просвета сосуда, прекращению кровотока в инфаркт-ответственной артерии (ИОА), ишемии миокарда в зоне кровоснабжения ИОА, а с течением непродолжительного времени – к его гибели [4].

Литературные данные указывают на то, что пациенты с ИМ без полной окклюзии ИОА характеризуются меньшей зоной ишемии и некроза миокарда и как следствие, менее тяжелым течением в остром и подостром периоде, меньшим риском развития осложнений и более благоприятными ближайшими и отдаленными исходами [5, 6]. Патогенетически это может быть обусловлено как относительной сохранностью антеградного кровотока, так и выраженностью внутрисистемных и межсистемных коллатералей.

Внедрение тромболизиса, развитие сети региональных сосудистых центров с возможностью экстренного эндоваскулярного лечения, оптимизация маршрутизации больных ИМ позволили существенно сократить сроки реперфузии ИОА и улучшить прогнозы, однако проблема продолжительности окклюзии ИОА и объема пораженного миокарда остается актуальной [7].

Оптимистичные данные современных клинических исследований, позволяют рассматривать возможность включения препаратов группы пероральных антикоагулянтов (ПОАК) в схему антитромботической терапии у пациентов с ИБС, представляющих категорию высокого риска атеротромботических осложнений [8, 9].

Предположение об эффективности комбинированной терапии ПОАК и дезагрегантами основано на одновременном воздействии на различные звенья гемостаза, что потенциально позволяет улуч-

шить контроль за процессами свертывания крови и тромбообразования. ПОАК блокируют синтез или функцию факторов свертывания крови, таких как тромбин, факторы II, VII, IX, X и XI, что способствует замедлению скорости образования сгустка [10]. Воздействуя на звенья коагуляционного каскада, ПОАК приводят к угнетению превращения фибриногена в фибрин-мономер и к подавлению тромбопоосредованной агрегации тромбоцитов [11]. Действие дезагрегантов, в свою очередь, также направлено на ингибирование активности тромбоцитов. Совместный эффект определяется в более эффективном подавлении агрегации тромбоцитов и формировании сгустка.

Несмотря на ожидаемые позитивные антитромботические эффекты совместного применения ПОАК и дезагрегантов, данная комбинация повышает риск геморрагических осложнений, что существенно ограничивает как возможность применения комбинации, так и применение ПОАК в терапевтических дозировках [12, 13]. В настоящее время рекомендованная доза ривароксабана в комбинированной терапии с ацетилсалициловой кислотой (АСК) для пациентов со стабильной ИБС и/или клинически значимым атеросклерозом периферических артерий, характеризующихся высоким риском ишемических осложнений, составляет 2,5 мг [14, 15]. Данная комбинация продемонстрировала свою относительную безопасность и эффективность в ряде крупных клинических исследований как у пациентов со стабильной ИБС, так и среди пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).

В последние годы число публикаций, описывающих высокую эффективность ПОАК в профилактике сердечно-сосудистых событий, существенно выросло, что указывает на большой интерес к проблеме [12, 14-16], однако данные о влиянии постоянного приема ПОАК на тяжесть клинического течения ИМ в остром периоде по-прежнему ограничены. Предполагается, что прием ПОАК может улучшить прогноз пациентов с ИМ не только за счет блокирования механизмов коагуляции, но и за счет улучшения реологических свойств крови и микроциркуляции в миокарде, противовоспалительного эффекта [17, 18]. Таким образом, дальнейшее проведение исследований необходимо для более глубокого понимания влияния терапии ПОАК на течение ИМ и оптимизации антитромботических стратегий.

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с ИМ

Показатель	Основная группа (n=41)	Контрольная группа (n=349)	p
Мужской пол, n (%)	25 (61,0)	215 (61,6)	0,9376
Возраст, лет	73,0 [62,0; 82,0]	63,0 [56,0; 71,0]	<0,0001
Возраст ≥65 лет, n (%)	28 (68,3)	154 (44,1)	0,0033
ИМТ, кг/м ²	29,0 [28,0; 31,0]	30,0 [27,0; 34,0]	0,1045
Индекс коморбидности Charlson	3,0 [2,0; 4,0]	3,0 [2,0; 4,0]	0,1395
Стенокардия напряжения в анамнезе, n (%)	36 (87,8)	266 (76,2)	0,0931
ПИКС, n (%)	14 (34,1)	107 (30,7)	0,6479
ЧКВ в анамнезе, n (%)	7 (17,1)	50 (14,3)	0,6377
АКШ, n (%)	3 (7,3)	5 (1,4)	0,0119
Наследственность, n (%)	7 (17,1)	61 (17,5)	0,9484
Сахарный диабет, n (%)	9 (22,0)	104 (29,8)	0,2947
Гипертоническая болезнь, n (%)	32 (78,0)	259 (74,2)	0,5933
ОНМК, n (%)	16 (39,0)	34 (9,7)	<0,0001
Венозные тромбозы, n (%)	6 (14,6)	11 (3,2)	0,0007
ФП, n (%)	31 (75,6)	45 (12,9)	<0,0001
Постоянная форма ФП, n (%)	4 (12,9)	6 (13,3)	1,0
COVID-19 в анамнезе, n (%)	12 (29,3)	154 (44,1)	0,0687

Данные представлены как медиана и межквартильный интервал – Ме [Q25; Q75], если не указано иное
АКШ – аортокоронарное шунтирование, ИМТ – индекс массы тела, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, ФП – фибрилляция предсердий, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, COVID-19 – COronaVirus Disease 2019

В условиях нестабильности атеросклеротической бляшки, разрыва ее покрышки, комбинированная терапия ПОАК и антиагрегантами потенциально может способствовать более медленному тромбообразованию и формированию более рыхлого сгустка [19]. Дегенерация структуры тромба и сдвиг коагуляционного гомеостаза в сторону гипокоагуляции может сопровождаться снижением частоты окклюзий просвета коронарных артерий тромботическими массами и увеличению частоты случаев спонтанных реперфузий, что потенциально может быть ассоциировано с более благоприятным течением ИМ. Изучение данной гипотезы легло в основу проведенного исследования.

Цель нашего исследования – изучение клинического течения ИМ и его госпитальных исходов у пациентов, получающих постоянную терапию ПОАК.

Материал и методы

Из госпитального регистра регионального сосудистого центра Городской клинической больницы им. В. П. Демикова г. Москвы были отобраны данные пациентов, получивших лечение по поводу ИМ в период с июля 2020 по март 2021 гг. Сведения о течении госпитального периода, результатах лабораторных и инструментальных исследований анализировались на основании информации, представленной в электронной медицинской карте Единой медицинской информационно-аналитической системы. Критерии включения: диагноз ИМ, верифицированный клинически и по данным лабораторных и инструменталь-

ных исследований; наличие архивных данных о проведенной коронароангиографии (КАГ); полнота данных электронной истории болезни.

Критерии невключения: острое повреждение миокарда, опосредованное проведением эндоваскулярного, хирургического вмешательства или явившееся осложнением иных методов лечения; смерть на догоспитальном этапе или до поступления в рентгеноперационную; отсутствие лабораторных данных об уровне тропонина I в крови и его динамике; хронические воспалительные заболевания в анамнезе, в т.ч. аутоиммунные; признаки внебольничной пневмонии, вне зависимости от этиологии; наличие гнойных ран и инфекций мягких тканей; верифицированные ранее злокачественные онкологические заболевания; анемия средней и тяжелой степени; признаки острой респираторной вирусной инфекции, а также наличие клинических или лабораторных данных, указывающих на острый период COVID-19 на момент поступления в стационар или выявившиеся в течение периода госпитализации.

Для последующего ретроспективного анализа отобраны данные 390 пациентов, соответствующих критериями включения. Протокол исследования одобрен независимым этическим комитетом ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России №05-02/21 от 03.06.2021 г. Всем пациентам проводился объем диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями по ведению пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST Минздрава РФ [20]. Оценивались клинико-анамнестические данные больных, результаты лабораторных исследований

Рисунок 1. Получаемые прямые пероральные антикоагулянты

(общий анализ крови, биохимический анализ крови, в т.ч. уровень С-реактивного белка, тропонина I в динамике, коагулограмма, исследование титра антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 полуколичественным методом, исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) мазка из рото- и носоглотки SARS-CoV-2), результаты инструментальных методов исследования (электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), КАГ). Изучено клиническое течение в госпитальном периоде, летальность и частота развития осложнений.

Статистический анализ данных выполнялся при помощи программ Excel 2016 ("Microsoft", США) и JMP Pro 17 ("SAS", США). Для оценки соответствия распределения непрерывных данных использовался критерий Колмогорова-Смирнова с коррекцией Лиллиефорса. Показатели с нормальным распределением или близкому к нему описывались средним и стандартным отклонением ("M±SD"), в ином случае – в виде медианы и интерквартильного размаха ("Me [Q25%; Q75%]"). Качественные признаки представлены в виде долей и частот выявления признака (%). Значимость различий между группами по количественным данным оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни, для качественных показателей – χ^2 Пирсона и точного критерия Фишера. Для оценки влияния факторов на исход применялась модель бинарной логистической регрессии с определением отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ). При проверке статистических гипотез, уровень значимости был зафиксирован на уровне ошибки первого рода равной 0,05.

Результаты

Средний возраст пациентов составил $64,1 \pm 12,8$ лет. Большинство больных составляли мужчины 61,5% (n=240). Доля больных с повторным ИМ – 31,0% (n=121), артериальной гипертензией (АГ) – 74,6 (n=291), сахарным диабетом (СД) 2 типа – 30,0% (n=113). АСК получали 26,9% (n=105), ПОАК – 10,5% (n=41) больных.

В зависимости от получаемой терапии пациенты были разделены на две группы, в основную группу вошел 41 пациент, находящейся на постоянной терапии ПОАК, а в контрольную группу – 349 пациентов, не принимавших ПОАК.

В табл. 1 представлены клиничко-anamnestические характеристики пациентов в изучаемых группах. Подавляющее большинство составляли лица мужского пола. Пациенты основной группы были старше, 68,3% (n=28) составляли больные 65 лет и старше (p=0,0033). Среди пациентов основной группы отмечалась большая доля лиц, которым ранее проводилось аортокоронарное шунтирование, с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), а также с венозными тромбозами в анамнезе (p<0,01). Фибрилляция предсердий (ФП) отмечалась у 75,6% (n=31) больных основной группы (p<0,0001), среди них постоянная форма в 19,3% (n=6) случаев.

На рис. 1 представлена частота приема различных ПОАК. Практически половина больных (48,8% (n=20)) получала ривароксабан в дозировках 15 и 20 мг в сутки (15% (n=3) и 85% (n=17), соответ-

Таблица 2. Медикаментозная терапия до развития ИМ у больных

Показатель	Основная группа (n=41)	Контрольная группа (n=349)	p
Ацетилсалициловая кислота, n (%)	8 (19,5)	97 (27,8)	0,2581
иАПФ, n (%)	8 (19,5)	80 (22,9)	0,6212
БРА, n (%)	6 (14,6)	40 (11,5)	0,5513
Антагонисты кальция, n (%)	3 (7,3)	31 (8,9)	0,7368
Бета-блокаторы, n (%)	11 (26,8)	63 (18,1)	0,1751
Нитраты, n (%)	4 (9,8)	36 (10,3)	0,9111
Статины, n (%)	3 (7,3)	68 (19,5)	0,0562
Антагонисты альдостерона, n (%)	1 (2,4)	23 (6,6)	0,2954
Антиаритмические препараты, n (%)	6 (14,6)	3 (0,9)	<0,0001

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина-II, иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Таблица 3. Сроки развития и локализация ИМ и данные объективного обследования пациентов с ИМ

Показатель	Основная группа (n=41)	Контрольная группа (n=349)	p
ИМнST, n (%)	16 (39,0)	165 (47,3)	0,3161
ИМбпST, n (%)	25 (61,0)	184 (52,7)	
Передняя локализация, n (%)	25 (61,0)	172 (49,3)	0,0546
Нижняя локализация, n (%)	8 (19,5)	133 (38,1)	
Боковая локализация, n (%)	8 (19,5)	44 (12,6)	
Время от первого контакта до госпитализации, мин	44,0 [37,0; 66,0]	61,00 [38,0; 85,50]	0,1587
Время от появления симптомов до КАГ, мин	240,0 [195,0; 360,0]	240,0 [150,0; 330,0]	0,5695
САД, мм рт.ст.	131,0 [112,0; 150,0]	135,0 [122,0; 148,0]	0,4649
ДАД, мм рт.ст.	74,0 [67,0; 90,0]	80,0 [73,0; 90,0]	0,1706
ЧСС, уд/мин	82,0 [72,0; 96,0]	76,0 [67,0; 90,0]	0,0352
SpO ₂ , %	96,0 [94,0; 97,0]	97,0 [96,0; 98,0]	0,0629
Killip I, n (%)	25 (61,0)	263 (75,4)	0,1549
Killip II, n (%)	9 (22,0)	51 (14,6)	
Killip III, n (%)	4 (9,8)	26 (7,4)	
Killip IV, n (%)	3 (7,3)	9 (2,6)	
Низкий риск (GRACE), n (%)	0 (0,0)	45 (12,9)	<0,0001
Средний риск (GRACE), n (%)	6 (14,6)	128 (36,7)	
Высокий риск (GRACE), n (%)	35 (85,4)	176 (50,4)	

Данные представлены как медиана и межквартильный интервал – Ме [Q25; Q75], если не указано иное

ДАД – диастолическое артериальное давление, ИМбпST – инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, ИМнST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, КАГ – коронароангиография, САД – систолическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений

ственно), а четверть – варфарин (24,4% (n=10)), при этом 8 пациентов амбулаторно не контролировали величину международного нормализованного отношения (МНО), 1 пациент проводил самостоятельный контроль МНО с помощью портативного коагулометра и лишь у 1 пациента имелись записи о регулярном контроле МНО в поликлинике по месту жительства в сроки, установленные лечащим врачом.

Пациенты основной группы значимо чаще принимали антиаритмические препараты (14,6% vs 0,9%, p<0,0001) и несколько реже статины (7,3% vs 19,5%), однако статистическая значимость межгрупповых различий не достигнута (p=0,0562). По частоте применения основных групп лекарственных препаратов в период, предшествующий настоящей госпитализации (табл. 2), обе группы статистически значимо между собой не различались (p>0,05).

У большинства пациентов диагностирован инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST, табл. 3). В основной группе инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМнST) регистрировался в 39,0% (n=16) случаев, тогда как в контрольной группе – в 47,3% (n=165), однако различия оказались статистически не значимыми (p=0,3161). В обеих группах преобладали больные с передней локализацией ИМ (p=0,0546). По временным интервалам от появления первых симптомов ишемии миокарда до госпитализации в стационар и до выполнения КАГ обе группы между собой сопоставимы (p=0,5695).

Выраженность явлений острой сердечной недостаточности Killip I-II наблюдалась у подавляющего большинства больных в обеих группах (p=0,1549, см. табл. 3). Пациенты основной группы статистиче-

Таблица 4. Данные инструментального обследования пациентов с ИМ

Показатель	Основная группа (n=41)	Контрольная группа (n=349)	p
ЭКГ			
Резолюция сегмента ST на ЭКГ при поступлении в стационар*, n (%)	7 (43,8)	30 (18,1)	0,0238
Преходящая АВ блокада 3 ст, n (%)	5 (12,2)	12 (3,7)	0,0240
Пароксизм ФП, n (%)	7 (17,1)	28 (8,0)	0,0765
ФЖ на ДГЭ, n (%)	3 (7,3)	12 (3,7)	0,2014
Частая ЖЭС, n (%)	1 (2,4)	18 (5,2)	0,7068
ЭхоКГ			
Нормокинез, n (%)	4 (10,8)	45 (13,3)	0,1506
Гипокинез, n (%)	13 (35,1)	146 (43,2)	
Акинез, n (%)	14 (37,8)	126 (37,3)	
Дискинез, n (%)	6 (16,2)	21 (6,2)	
ФВ ЛЖ, %	46,0 [36,5; 55,0]	49,0 [43,0; 55,0]	0,1624
КАГ			
TIMI 0-1, n (%)	16 (39,0)	166 (47,6)	0,2998
TIMI 2-3, n (%)	25 (61,0)	183 (52,4)	
Правый тип КК, n (%)	29 (70,7)	245 (70,2)	0,0998
Многососудистое поражение, n (%)	13 (31,7)	122 (35,0)	0,6791
Стентирование ИОА, n (%)	38 (92,7)	336 (96,3)	0,2727
ЧКВ на других сосудах, n (%)	2 (4,9)	39 (11,2)	0,2137
Феномен no/slow reflow, n (%)	3 (7,3)	14 (4,0)	0,3268
SyntaxScore, баллов	11,5 [8,5; 30,0]	16,0 [9,5; 28,0]	0,7589
* – для пациентов с ИМnST (n=16 в основной группе, n=165 в контрольной группе) Данные представлены как медиана и межквартильный интервал – Ме [Q25; Q75], если не указано иное АВ – атриовентрикулярная, ДГЭ – догоспитальный этап, ЖЭС – желудочковая экстрасистолия, ИОА – инфаркт-ответственная артерия, КАГ – коронароангиография, КК – коронарный кровоток, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ФЖ – фибрилляция желудочков, ФП – фибрилляция предсердий, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, ЭКГ – электрокардиография, ЭхоКГ – эхокардиография			

Таблица 5. Результаты лабораторных исследований у пациентов с ИМ

Показатель	Основная группа (n=41)	Контрольная группа (n=349)	p
Общий и биохимический анализ крови			
Эритроциты, 10 ¹² /л	4,3 [3,5; 4,6]	4,7 [4,3; 5,0]	0,0002
Гемоглобин, г/л	132,0 [111,0; 144,0]	139,5 [127,3; 151,0]	0,0015
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	8,70 [7,8; 10,5]	9,45 [7,7; 11,9]	0,4416
Тромбоциты, 10 ⁹ /л	235,0 [202,0; 263,0]	250,5 [207,5; 296,8]	0,0536
Креатинин, мкмоль/л	102,4 [94,1; 124,5]	92,0 [77,8; 106,1]	0,0015
Общий холестерин, ммоль/л	4,5 [3,7; 5,0]	5,0 [4,0; 6,1]	0,0261
Калий, ммоль/л	4,4 [4,1; 4,8]	4,2 [3,9; 4,6]	0,1239
СРБ, мг/л	15,4 [5,9; 20,9]	15,0 [5,0; 42,5]	0,7308
Тропонин I, нг/мл	2,4 [0,9; 9,1]	4,1 [1,7; 10,4]	0,2646
Коагулограмма			
АЧТВ, сек	28,2 [25,5; 36,5]	25,8 [22,1; 29,2]	0,0748
Протромбиновое время, сек	14,7 [13,1; 16,6]	12,9 [12,0; 14,1]	0,0089
МНО	1,4 [1,2; 1,5]	1,2 [1,1; 1,3]	0,0063
Фибриноген, г/л	5,04 [4,1; 6,0]	3,4 [2,4; 5,0]	0,5170
Данные представлены как медиана и межквартильный интервал – Ме [Q25; Q75], если не указано иное АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время, СРБ – с-реактивный белок, МНО – международное нормализованное отношение			

ски значительно чаще относились к категории высокого госпитального риска в соответствии со шкалой GRACE 1.0 по сравнению с пациентами контрольной группы (85,4% (n=35) и 50,4% (n=176), p<0,0001).

В табл. 4 представлены данные инструментальных методов обследования. Возврат сегмента ST к изолинии на ЭКГ при поступлении в стационар значительно чаще регистрировался у пациентов основной

Таблица 6. Госпитальные исходы и осложнения у пациентов с ИМ

Показатель	Основная группа (n=41)	Контрольная группа (n=349)	p
Длительность госпитализации, дни	9,0 [7,0; 10,0]	8,0 [5,0; 9,0]	0,0731
Пароксизм ФП, n (%)	7 (17,1)	14 (4,0)	0,0032
Тромбоз стента, n (%)	0 (0,0)	2 (0,6)	0,6270
ОНМК, n (%)	1 (2,4)	4 (1,1)	0,4864
ЖКК, n (%)	3 (7,3)	6 (1,7)	0,0579
Летальный исход, n (%)	5 (12,2)	21 (6,0)	0,1336
Данные представлены как медиана и межквартильный интервал – Me [Q25; Q75], если не указано иное			
ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение, ФП – фибрилляция предсердий, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения			

группы ($p=0,0238$). Эпизоды полной АВ-блокады выявлялись у 12,2% ($n=5$) больных основной группы, что статистически значимо чаще, по сравнению с контрольной группой – 3,7% ($n=12$) ($p=0,0240$). По данным ЭхоКГ, объему поражения коронарного русла, частоте выполнения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) изучаемые группы были сопоставимы ($p>0,05$). Феномен *no/slow reflow* отмечался у 4,3% ($n=17$) пациентов, значимых различий между группами не выявлено ($p=0,3268$).

По результатам лабораторных исследований, у пациентов основной группы отмечался меньший уровень эритроцитов, более низкая концентрация гемоглобина, холестерина по сравнению с пациентами контрольной группы ($p<0,05$) (табл. 5). Уровень креатинина плазмы, величина протромбинового времени и МНО оказались значимо выше в основной группе ($p<0,05$). Значение МНО у пациентов получающих варфарин составило 2,1 [1,7; 2,9], 7 пациентов из 10 достигли целевых значений (МНО 2-3), у 1 больного значение МНО составило 4,8 и потребовало временного прекращения приема варфарина.

Все пациенты основной группы на госпитальном этапе получали тройную антитромботическую терапию: АСК, клопидогрел и ПОАК. Пациенты контрольной группы получали двойную антитромбоцитарную терапию: АСК, ингибитор P2Y₁₂ (prasugrel или тикагрелор и в двух случаях клопидогрел).

Средняя продолжительность госпитализации составила 8,0 [6,0; 9,0] дней для пациентов обеих групп (табл. 6). Пароксизмы ФП значимо чаще наблюдались в основной группе пациентов, по сравнению с контрольной ($p=0,0032$). В основной группе зарегистрировано 7,3% ($n=3$) случаев желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) на фоне обострения язвенной болезни желудка, тогда как в контрольной группе – 1,7% ($n=6$), ОШ 4,5 (95% ДИ 1,09–18,78; $p=0,038$). Общая летальность составила 6,7% ($n=26$), из которых 12,2% ($n=5$) в основной группе и 6,0% ($n=21$) в контрольной ($p=0,1336$). В основной группе не зарегистрировано ни одного случая тромбоза стента, в группе контроля отмечался 1 случай острого и 1 случай подострого тромбоза ранее имплантированного стента ($p=0,6270$).

В результате многофакторного анализа с поправкой на пол, возраст, индекс массы тела, тип ИМ, наличие СД, тяжесть острой сердечной недостаточности, степень поражения коронарного русла, значимости, в качестве независимого предиктора исхода, факт постоянного приема ПОАК не продемонстрировал – ОШ 1,47 (95% ДИ 0,37–5,85; $p=0,5110$). Аналогичные результаты получены и при оценке шансов развития ЖКК – ОШ 3,96 (95% ДИ 0,76–20,66; $p=0,6120$).

Обсуждение

В результате выполненного анализа не удалось выявить значимого влияния постоянного приема ПОАК на клиническое течение ИМ. Пациенты основной и контрольной группы оказались сопоставимы как по типу ИМ, так и по изученным характеристикам антеградного кровотока в ИОА.

Важно отметить, что все пациенты с ИМ, в соответствии с клиническими рекомендациями, в остром периоде получали инфузию нефракционированного гепарина или инъекции низкомолекулярных гепаринов, а после проведения ЧКВ – тройную антитромботическую терапию в составе АСК, ингибитора P2Y₁₂ и привычного ПОАК в рекомендованной лечебной дозировке [21, 22].

Пациенты изучаемой нами когорты, в целом оказались более отягощенными по факторам риска в сравнении с пациентами московского регистра ОКС [23]. Около 30% пациентов имели СД, переносили ранее ИМ и отмечали клинические проявления предшествующей стенокардии напряжения, что существенно чаще показателей, представленных в регистре. Группа пациентов, постоянно получавших ПОАК была значимо старше, треть из них переносили ранее ИМ, чаще отмечались ОНМК, имели более выраженный коморбидный фон; подавляющее большинство больных составляли пациенты с ФП и тромбозами, что и являлось фактором, определившим постоянный прием ПОАК.

Наиболее частым ПОАК, назначенным в изученной когорте больных, был ривароксабан, что, по

всей видимости, связано с его относительно высокой популярностью среди врачебного сообщества, доказанной эффективностью и безопасностью [24]. Также обращает на себя внимание значительная доля больных, получающих варфарин (практически четверть пациентов принимали антагонист витамина К). Однако ни один из них не имел данных, указывающих на наличие объективных противопоказаний к приему ПОАК. Учитывая ретроспективный дизайн исследования, установить обоснованность назначения варфарина в каждом конкретном случае не представлялось возможным, однако одной из вероятных причин, может быть экономический аспект. Данные ранее опубликованных отчетов указывают, что несмотря на повышение доступности ПОАК в льготной сети, применение варфарина до сих пор остается на достаточно высоком уровне [16, 25].

В группе ПОАК основная доля пациентов получала бета-блокаторы, в то время как амиодарон и соталол принимали лишь небольшое число больных. Также обращает на себя внимание низкая частота приема статинов в целом, несмотря на высокую коморбидность и частоту ишемических событий в анамнезе [26].

Основной контингент включенных пациентов характеризовался высоким расчетным госпитальным риском по шкале GRACE 1.0, что в т.ч. обусловлено критериями включения в исследования (верифицированный ИМ, наличие стенозирующего атеросклеротического поражения по данным КАГ), а также особенностями и сроками маршрутизации пациентов более высокого риска в ангиографическую лабораторию. Так, пациенты низкого и среднего риска, у которых по каким-либо причинам не выполнялась КАГ, в выборку не вошли.

Более низкий уровень эритроцитов и гемоглобина в группе, находившейся на терапии ПОАК, косвенно может являться следствием побочных эффектов, обусловленных приемом ПОАК. Однако важно отметить, что средние значения, не выходили за пределы референтного интервала.

По результатам КАГ, у пациентов, получающих ПОАК реже наблюдалась окклюзия ИОА, по сравнению с теми, кто не принимал ПОАК, однако несмотря на это группы были сопоставимы по тяжести клинического течения, выраженности нарушений сократительной функции миокарда, летальности.

Между тем, можно отметить тенденцию к несколько более высокой частоте ЖКК в госпитальном периоде (7,3%) у пациентов, получавших ПОАК, по сравнению с пациентами, не получавшими ПОАК (1,7%), которая имеет объективные основания достичь статистической значимости при увеличении объема выборки.

ПОАК продолжают набирать популярность в качестве эффективного и безопасного дополнения к стандартной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ИБС высокого коронарного риска для профилактики сосудистых осложнений. Анализ эффективности приема ПОАК у пациентов с острой коронарной патологией представляется перспективным направлением для будущих исследований.

Ограничение исследования

Небольшой объем выборки и ретроспективный дизайн, который не позволял получить ряд важных данных о применении ПОАК, таких как длительность приема препаратов, их дозировка, регулярность, частота малых и больших кровотечений и пр., что, несомненно, играет существенную роль при оценке эффективности проводимой терапии.

Заключение

В результате проведенного исследования установлено, что у пациентов с ИМ, находящихся на постоянной терапии ПОАК, значимо чаще регистрировался возврат сегмента ST к изолинии при поступлении в стационар, однако, несмотря на более старший возраст, и более высокий риск по шкале GRACE 1.0, летальность и частота развития осложнений в госпитальном периоде сопоставима с группой больных, не получавших ПОАК.

Отношения и Деятельность. Нет.
Relationships and Activities. None.

Финансирование. Исследование проведено при поддержке Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

Funding. The study was performed with the support of National Research Center for Therapy and Preventive Medicine.

References / Литература

1. Shalnova SA, Drapkina OM, Kutsenko VA, et al. Myocardial infarction in the population of some Russian regions and its prognostic value. *Russ J Cardiol.* 2022;27(6):4952. (In Russ.) [Шальнова С.А., Драпкина О.М., Куценко В.А., и др. Инфаркт миокарда в популяции некоторых регионов России и его прогностическое значение. *Российский кардиологический журнал.* 2022;27(6):4952]. DOI:10.15829/1560-4071-2022-4952.
2. Ryagina VA, Matrenin KI, Shchurov DG, Teptsova TS. Pharmacoeconomic analysis of antithrombotic therapy in patients with acute coronary syndrome and patients with atrial fibrillation who underwent percutaneous coronary intervention. *Farmakoeconomika. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology.* 2022;15(4):407-417 (In Russ.)

[Рягина В.А., Матрёнин К.И., Щуров Д.Г., Тепцова Т.С. Фармакоэкономический анализ применения антитромботической терапии у пациентов с острым коронарным синдромом, а также у пациентов с фибрилляцией предсердий, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству. *Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.* 2022;15(4):407-417]. DOI:10.17749/2070-4909/farmakoeconomika.2022.156.

3. Gorbacheva NS, Veselovskaya NG, Nikolaeva MG, et al. New risk factors for acute myocardial infarction in young men. *Kardiologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training].* 2022; 10 (3):42-49 (In Russ.) [Горбачева Н.С.,

- Веселовская Н.Г., Николаева М.Г., и др. Новые факторы риска острого инфаркта миокарда у мужчин молодого возраста. Кардиология: Новости Мнения Обучение. 2022;10:42-9]. DOI:10.33029/2309-1908-2022-10-3-42-49.
4. Eremkina T.Ya, Sychev IV, Ryzhov AV, et al. Pathogenetic mechanisms of development of myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries: modern view of the problem. Modern Problems of Science and Education. 2020; 150:1 (In Russ.) [Еремкина Т.Я., Сычев И.В., Рязов А.В., и др. Патогенетические механизмы развития инфаркта миокарда без обструктивного атеросклероза коронарных артерий: современный взгляд на проблему. Современные Проблемы Науки и Образования. 2020; 150:1]. DOI:10.17513/spno.29918.
 5. Aslanger EK. Beyond the ST-segment in Occlusion Myocardial Infarction (OMI): Diagnosing the OMI-nous. Turkish J Emerg Med. 2023;23:1-4. DOI:10.4103/2452-2473.357333.
 6. Помозова ТР, Лыков ЮВ, Комарова ИС, et al. Clinical and laboratory features of primary acute myocardial infarction in patients with obstructive and non-obstructive coronary atherosclerosis. Kardiologiya. 2019;59:41-51 (In Russ.) [Помозова Т.П., Лыков Ю.В., Комарова И.С., и др. Клинико-лабораторные особенности первичного острого инфаркта миокарда у пациентов с обструктивным и неструктурным коронарным атеросклерозом. Кардиология. 2019;59(10S):41-51]. DOI:10.18087/cardio.2640.
 7. Kontsevaeva AV, Bates K, Schirmer H, et al. Management of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction in Russian hospitals adheres to international guidelines. Open Heart. 2020;7. DOI:10.1136/openhrt-2019-001134.
 8. Kashtalap VV, Barbarash OL. Actual problems of antithrombotic therapy in acute coronary syndrome (following the material presented at the European society of cardiology congress 2017). Medical Council. 2017;(12):82-88 (In Russ.) [Кашталап В.В., Барбараш О.Л. Актуальные проблемы анти тромботической терапии при остром коронарном синдроме. Медицинский совет. 2017;12:82-88]. DOI:10.21518/2079-701X-2017-12-82-88.
 9. Soloveva MV, Boldueva SA. Antithrombotic therapy and its impact on prognosis in patients with atrial fibrillation and myocardial infarction. Long-term observation results. CardioSomatics. 2021;12(3):158-165 (In Russ.) [Соловьева М.В., Болдуева С.А. Анти тромботическая терапия и ее влияние на прогноз у больных с фибрилляцией предсердий, перенесших инфаркт миокарда. Данные многолетнего наблюдения. CardioSomatika. 2021;12(3):158-165]. DOI:10.17816/22217185.2021.3.201044.
 10. Reagan WJ, Brooks MB, Grozovsky R, et al. To Clot or Not to Clot: Deepening Our Understanding of Alterations in the Hemostatic System. Toxicol Pathol. 2022;50(7):890-4. DOI:10.1177/01926233221125172.
 11. Margetić S, Goretá SŠ, Čelap I, et al. Direct oral anticoagulants (DOACs): From the laboratory point of view. Acta Pharm. 2022;72:459-82. DOI:10.2478/acph-2022-0034.
 12. Wang W, Huang Q, Pan D, et al. The optimal duration of triple antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation and acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention: A network meta-analysis of randomized clinical trials. Int J Cardiol. 2022;357:33-8. DOI:10.1016/j.ijcard.2022.03.047.
 13. Haller PM, Sulzgruber P, Kaufmann C, et al. Bleeding and ischaemic outcomes in patients treated with dual or triple antithrombotic therapy: systematic review and meta-analysis. Eur Hear J Cardiovasc Pharmacother. 2019;5:226-36. DOI:10.1093/EHJCV/PVZ021.
 14. Fanaroff AC, Hasselblad V, Roe MT, et al. Antithrombotic Agents for Secondary Prevention after Acute Coronary Syndromes: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Int J Cardiol. 2017;241:87. DOI:10.1016/j.IJCARD.2017.03.046.
 15. Liu J, Fan M, Zhao J, et al. Efficacy and safety of antithrombotic regimens after coronary intervention in patients on oral anticoagulation: Traditional and Bayesian meta-analysis of clinical trials. Int J Cardiol. 2016;205:89-96. DOI:10.1016/j.ijcard.2015.12.005.
 16. Panchenko EP. Is there still room for warfarin after the appearance of direct oral anticoagulants? Atherothrombosis. 2023;12(2):32-42 (In Russ.) [Панченко Е.П. Осталось ли место для варфарина после появления прямых оральных антикоагулянтов? Атеротромбоз. 2022;12(2):32-42]. DOI:10.21518/2307-1109-2022-12-2-32-42.
 17. Nakase T, Moroi J, Ishikawa T. Anti-inflammatory and antiplatelet effects of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in acute phase of ischemic stroke patients. Clin Transl Med. 2018;7:2-7. DOI:10.1186/s40169-017-0179-9.
 18. Borst O, Münzer P, Alnaggar N, et al. Inhibitory mechanisms of very low-dose rivaroxaban in non-ST-elevation myocardial infarction. Blood Adv. 2018;2:715-30. DOI:10.1182/bloodadvances.2017013573.
 19. Ghattas A, Shantsila E, Lip GYH. Antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention in anticoagulated patients: A fine balance between thrombosis and bleeding. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2011;5:5-9. DOI:10.1177/1753944710397225.
 20. 2020 Clinical practice guidelines for Acute ST-segment elevation myocardial infarction. Russian Journal of Cardiology. 2020;25(11):4103. (In Russ.) [Клинические рекомендации 2020. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Российский Кардиологический Журнал. 2020;51(11):251-310]. DOI:10.15829/29/1560-4071-2020-4103.
 21. Yavelov IS. Parenteral anticoagulants in the treatment of acute coronary syndrome: what modern clinical guidelines say. Atherothrombosis. 2022;12(1):46-58 (In Russ.) [Явелов И.С. Парентеральные антикоагулянты в лечении острого коронарного синдрома: что говорят современные клинические рекомендации. Атеротромбоз. 2022;12(1):46-58]. DOI:10.21518/2307-1109-2022-12-1-46-58
 22. Barbarash OL, Duplyakov DV, Zateishnikov DA, et al. 2020 Clinical Practice Guidelines for Acute Coronary Syndrome Without ST Segment Elevation. Russ J Cardiol. 2021;26(4):149-202 (In Russ.) [Барбараш О.Л., Дупляков Д.В., Затеищиков Д.А. и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4449]. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4449.
 23. Ehrlich AD. Moscow's first case of acute coronary syndrome: results of a 6-month follow-up. Neotlozhnaja kardiologija 2014;2:3-9 (In Russ.) [Эрлих А.Д. Первый московский регистр острого коронарного синдрома: результаты 6-месячного наблюдения. Неотложная кардиология. 2014;(2):3-9].
 24. Turpie AGG. Advances in oral anticoagulation treatment: The safety and efficacy of rivaroxaban in the prevention and treatment of thromboembolism. Ther Adv Hematol. 2012;3:309-23. doi:10.1177/2040620712453067.
 25. Tavlujeva EV, Savkova ON, Zernova E V, et al. Prevalence of oral anticoagulant therapy in clinical practice in patients hospitalized with acute ischemic stroke. Russ J Cardiol. 2023;27(12):5149 (In Russ.) [Тавлуева Е.В., Савкова О.Н., Зернова Е.В. и др. Частота использования пероральных антикоагулянтов в реальной клинической практике у пациентов, госпитализированных с острым ишемическим инсультом. Российский кардиологический журнал. 2022;27(12):5149]. DOI:10.15829/1560-4071-2022-5149.
 26. Zharkova ED, Martsevich SY, Lukina YV, et al. Assessment of the Quality of Drug Therapy in Patients with Stable Coronary Artery Disease in the Second Stage of the ALIGN Study. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2022;18(3):306-310 (In Russ.) [Жаркова Е.Д., Марцевич С.Ю., Лукина Ю.В. и др. Оценка качества медикаментозной терапии у пациентов со стабильно протекающей ишемической болезнью сердца в рамках второго этапа исследования ALIGN. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(3):306-310]. DOI:10.20996/1819-6446-2022-06-12.

Сведения об Авторах/About the Authors

Чащин Михаил Георгиевич [Mikhail G. Chashchin]
eLibrary SPIN 4511-5960, ORCID 0000-0001-6292-3837
Горшков Александр Юрьевич [Alexandr Yu. Gorshkov]
eLibrary SPIN 6786-8438, ORCID 0000-0002-1423-214X

Драпкина Оксана Михайловна [Oxana M. Drapkina]
eLibrary SPIN: 4456-1297, ORCID 0000-0002-4453-8430