АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Бета-адреноблокаторы при хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: возможен ли депрескрайбинг?

Закиев В. Д.^{1*}, Воробьева Н. М.¹, Малая И. П.¹, Гвоздева А. Д.², Ткачева О. Н.¹

¹ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова" Минздрава России, Москва, Россия

²ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. акад. Е. И. Чазова" Минздрава России, Москва, Россия

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – сложный клинический синдром, характеризующийся плохим прогнозом. По данным российского эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН, более половины больных ХСН имеют сохранную фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ). До сих пор ни один класс препаратов не доказал своей эффективности в отношении улучшения прогноза этого заболевания. Несмотря на то, что в действующих клинических рекомендациях не поддерживается рутинное использование бета-адреноблокаторов (β-АБ) у больных ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ при отсутствии других показаний к ним, многие пациенты с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ принимают эти лекарственные средства необоснованно. В обзоре представлены данные исследований, посвященных изучению эффективности и безопасности β-АБ при ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ и их отмены. В большинство исследований включали больных ХСН с ФВ ЛЖ >40%, т.е. не только с сохраненной, но и с промежуточной ФВ ЛЖ. При этом лишь в единичных работах анализировали только пациентов с ФВ ЛЖ ≥50%. Если в ряде исследований реальной клинической практики и метаанализе таких исследований был продемонстрирован положительный эффект β-АБ при ХСН с ФВ ЛЖ >40%, то в рандомизированных клинических исследованиях и их метаанализах был выявлен либо незначительный положительный эффект, либо его отсутствие. В исследованиях с участием только пациентов с ФВ ЛЖ >50% показано либо отсутствие эффекта β-АБ, либо даже их негативное действие. К настоящему моменту опубликована одна работа, посвященная изучению отмены β-АБ у пациентов с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ и хронотропной недостаточностью, которое показало положительный эффект депрескрайбинга на переносимость физической нагрузки и качество жизни. Ввиду противоречивости данных требуется проведение хорошо спланированных исследований, направленных на изучение влияния β-АБ на симптомы и прогноз у больных ХСН с ФВ ЛЖ ≥50%. Перспективы депрескрайбинга β-АБ при ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ также требуют дальнейшего изучения и проведения рандомизированных клинических исследований, в т.ч. для определения групп пациентов, которым это может быть полезно.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, сохраненная фракция выброса левого желудочка, бета-адреноблокаторы, депрескрайбинг.

Для цитирования: Закиев В. Д., Воробьева Н. М., Малая И. П., Гвоздева А. Д., Ткачева О. Н. Бета-блокаторы при хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: возможен ли депрескрайбинг? *Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии*. 2023;19(6):607-613. DOI: 10.20996/1819-6446-2023-2987. EDN JMTTBF

Beta-blockers in chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction: is deprescribing possible?

Zakiev V. D.^{1*}, Vorobyeva N. M.¹, Malaya I. P.¹, Gvozdeva A. D.², Tkacheva O. N.¹

¹Russian Clinical and Research Center of Gerontology, Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

²E. I. Chazov National Medical Research Center of Cardiology, Moscow, Russia

Chronic heart failure (CHF) is a complex clinical syndrome characterized by poor prognosis. According to the Russian epidemiological study EPOHA-CHF, more than half of patients with CHF have preserved left ventricular ejection fraction (LV EF). However, no class of drugs has proven effectiveness in improving the prognosis of this disease. Although current clinical guidelines do not recommend the routine use of beta-blockers in CHF patients with preserved LV EF in the absence of other indications for them, many patients with CHF with preserved LV EF take these drugs unreasonably. The review presents the data from studies on the efficacy and safety of betablockers in CHF with preserved LV EF and its withdrawal.

Most studies included patient with LV EF >40%, a few of them analyzed only patients with LVEF ≥50%. Some studies of real clinical practice and meta-analysis of such studies demonstrated a positive effect of beta blockers in patients with LV EF > 40%, however randomized clinical trials and their meta-analyses revealed either a slight beneficial effect of beta-blockers. Studies involving only patients with LV EF ≥50% didn't show the beneficial effects of beta blockers. There is only one trial accessing the withdrawal of beta blockers in patients with CHF with preserved LV EF and chronotropic insufficiency. The study showed a positive effect of deprescribing on exercise tolerance and quality of life.

Due to controversial data, well-designed trials to examine the effect of beta-blockers on symptoms and prognosis in patients with CHF with LVEF ≥50% are required. Deprescribing of beta-blockers also require further assessment.

Keywords: chronic heart failure, preserved ejection fraction, beta-blockers, deprescribing.

For citation: Zakiev V. D., Vorobyeva N. M., Malaya I. P., Gvozdeva A. D., Tkacheva O. N. Beta-blockers in chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction: is deprescribing possible? *Rational Pharmacotherapy in Cardiology*. 2023;19(6):607-613. DOI:10.20996/1819-6446-2023-2987. EDN JMТТBF

*Corresponding Author (Автор, ответственный за переписку): zakiev739@gmail.com

Received/Поступила: 09.11.2023

Review received/Рецензия получена: 20.11.2023

Accepted/Принята в печать: 22.12.2023

Введение

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — сложный клинический синдром с симптомами и признаками, возникающими в результате любого структурного или функционального нарушения наполнения желудочков или выброса крови [1]. В настоящее время ХСН классифицируется по величине фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) на 3 группы: с низкой (<40%), умеренно сниженной (промежуточной) (40-49%) и сохранной ($\geq$ 50%) ФВ ЛЖ [1-3]. Длительное время при ХСН сохранной считали ФВ ЛЖ, равную или >40%, однако на сегодняшний день критерием сохранной ФВ ЛЖ является величина $\geq$ 50%. Такое историческое несоответствие в классификации затрудняет интерпретацию результатов исследований, т.к. во многие из них включали пациентов с ФВ ЛЖ >40%, т.е. в анализ попадали и больные ХСН с промежуточной ФВ ЛЖ.

По данным российского эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН, за 20 лет распространенность ХСН увеличилась с 6,1 до 8,2%, при этом прогноз пациентов по-прежнему остаётся неблагоприятным: медиана времени дожития при ХСН I-II функционального класса составляет 8,4 (95% доверительный интервал (ДИ): 7,8–9,1) года, а при ХСН III-IV функционального класса — всего 3,8 (95% ДИ: 3,4–4,2) года [4]. Более 50% больных ХСН имеют сохранную ФВ ЛЖ, при этом доля таких пациентов продолжает увеличиваться [4]. По данным российских регистров, 5-летняя выживаемость больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ составляет 74,4%, а средняя частота госпитализаций в течение года наблюдения — 16,2% [5].

В основе ХСН с сохранной и низкой ФВ ЛЖ лежат различные этиологические и патофизиологические механизмы, что требует разного подхода к лечению этих состояний [6]. Несмотря на широкую распространенность ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, до сих пор ни один класс препаратов не доказал свою эффективность в отношении улучшения прогноза этого заболевания [6]. В недавно опубликованном консенсусе экспертов Американской коллегии кардиологов для лечения ХСН с сохранной ФВ ЛЖ рекомендуется использовать ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера (дапаглифлозин или эмпаглифлозин), а так-

же ингибиторы ангиотензиновых рецепторов и не-прилизина, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, блокаторы рецепторов к ангиотензину и диуретики (у пациентов с задержкой жидкости) [7]. Однако, как показали исследования, эти препараты не снижали смертность пациентов, хотя и уменьшали частоту госпитализаций.

Эффективность различных бета-адреноблокаторов (β -АБ) при лечении ХСН с низкой ФВ ЛЖ была продемонстрирована в многочисленных рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) [8-12], что нашло отражение в клинических рекомендациях — на сегодняшний день β -АБ являются одним из основных компонентов терапии ХСН с низкой ФВ ЛЖ, значительно улучшая прогноз больных. Однако при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ при отсутствии других показаний к β -АБ их назначение не рекомендовано [1, 2, 7].

С другой стороны, в реальной клинической практике и клинических исследованиях многие больные ХСН с сохранной ФВ ЛЖ всё же принимают β -АБ. Например, в исследовании PARAGON-HF β -АБ получали 80% пациентов, однако далеко не все из них имели показания к их назначению [13]. По данным В. Yim и соавт., 68% гериатрическим пациентам, госпитализированным в стационар по поводу ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, при выписке были назначены β -АБ, при этом только 60% из них они были показаны в связи с другими причинами, такими как нарушения ритма сердца или перенесенный инфаркт миокарда [14]. Согласно опросу, почти четверть врачей назначают β -АБ больным ХСН с сохранной ФВ ЛЖ без четких показаний к ним, в то же время 40% врачей не отменяют назначенные ранее β -АБ или делают это редко [15].

Обзор основных исследований бета-адреноблокаторов при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ

На сегодняшний день проведено несколько РКИ, посвященных изучению эффективности β -АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ. Эти исследования в основном были небольшими по численности или представляли собой вторичный анализ или субанализ данных более крупных исследований. В некоторых из них оценивали только "суррогатные" конечные точки (дистанцию

Таблица 1. Результаты некоторых рандомизированных клинических исследований β-АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ

Исследование и год публикации	Продолжительность наблюдения	Количество участников с ХСН с сохранной ФВ	ЛС	ФВ, %	Основные результаты
Post-hoc анализ SENIORS, 2009 [12, 17]	Среднее (±SD) – 21±9,2 мес.	643	Небиволол vs плацебо	> 40	Отсутствие влияния на следующие события: - Комбинированная конечная точка, включающая смерть от всех причин или сердечно-сосудистые госпитализации (ОтнР=0,82, 95% ДИ: 0,62-1,08) - Смертность от всех причин (ОтнР=0,92, 95% ДИ: 0,61-1,36) - Сердечно-сосудистая смерть (ОтнР=0,80, 95% ДИ: 0,49-1,32)
ELANDD, 2012 [26]	6 мес.	116	Небиволол vs плацебо	> 45	Меньшее увеличение дистанции в тесте 6-минутной ходьбы: - Изменение в группе небиволола: +7,8±34,5 м, p=0,094 - Изменение в группе плацебо: +33,54±63,8 м, p<0,001 - Различие между группами: p=0,004
J-DHF, 2013 [16]	Медиана – 3,2 года	245	Карведилол vs без карведилола	> 40	Отсутствие влияния на следующие события: - Комбинированная конечная точка, включающая сердечно-сосудистую смерть и неплановые госпитализации по поводу ХСН (ОР=0,90, 95% ДИ: 0,54-1,49) - Общая смертность (ОР=0,99, 95% ДИ: 0,53-1,86) - Ухудшение симптомов (ОР=0,88, 95% ДИ: 0,47-1,64) - Комбинированная конечная точка, включающая сердечно-сосудистую смерть и незапланированные госпитализации по поводу сердечно-сосудистых причин (ОР=0,77, 95% ДИ: 0,50-1,17)
Субанализ CIBIS-ELD, 2016 [27]	12 нед	Нет данных	Карведилол или бисопролол	> 45	Нет значимого изменения: - Дистанции в тесте 6-минутной ходьбы (+4 м, 95% ДИ: -8-16, p=0,52) - Качества жизни по данным опросников SF-36 PFS (+1,1, 95% ДИ: 1,7-3,9, p=0,44), SF-36 PCS (+1,1, 95% ДИ: 0,1-2,2, p=0,08), SF-36 MCS (+0,4, 95% ДИ: 1,2-2,0, p=0,61)
Вторичный анализ TOPCAT, 2019 [18]	Медиана – 2,4 года	1761	β-АБ vs нет β-АБ	> 50	Повышение риска: - Госпитализаций по поводу ХСН (ОтнР=1,74, 95% ДИ: 1,28-2,37, p<0,001) Отсутствие влияния на следующие события: - Сердечно-сосудистая смертность, скорректированная по полу, возрасту, расе и сопутствующим заболеваниям (ОтнР=1,24, 95% ДИ: 0,85-1,79)
				45-49	Отсутствие влияния на следующие события: - Госпитализации по поводу ХСН (ОтнР=0,68, 95% ДИ: 0,28-1,63) - Сердечно-сосудистая смертность, скорректированная по полу, возрасту, расе и сопутствующим заболеваниям (ОтнР=0,62, 95% ДИ: 0,25-1,58)
β-АБ – бета-адреноблокаторы, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФВ – фракция выброса, ЛС – лекарственное средство, ОтнР – отношение рисков, ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал					

в тесте 6-минутной ходьбы, изменение концентрации натрийуретических пептидов (НУП), эхокардиографические показатели), а также включали в анализ больных ХСН с ФВ ЛЖ >40% (табл. 1).

Результаты этих исследований неоднозначные. Например, в J-DHF и SENIORS не было продемонстрировано значимого влияния β-АБ на сердечно-

сосудистую и общую смертность у больных ХСН с ФВ ЛЖ >40% [12, 16, 17]. В обоих РКИ частоту госпитализаций оценивали только в составе комбинированных конечных точек, причём в J-DHF учитывали незапланированные госпитализации по поводу ХСН и сердечно-сосудистых причин (в составе разных комбинированных конечных точек), а в SENIORS – неза-

планируемые госпитализации в связи с сердечно-сосудистыми причинами. При этом не было выявлено влияния β -АБ на риск всех комбинированных конечных точек.

Вторичный анализ исследования TOPCAT, из которого были исключены пациенты из России и Грузии, показал увеличение риска госпитализаций по поводу ХСН на 74% у пациентов с ФВ ЛЖ $\geq 50\%$ по сравнению с больными, не получавшими β -АБ (отношение рисков (ОтнР)=1,74, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,28-2,37, $p < 0,001$), при этом приём β -АБ не оказывал влияния на сердечно-сосудистую смертность [18]. В то же время среди пациентов с ФВ ЛЖ 45-49% увеличения риска госпитализаций по поводу ХСН у пациентов, принимавших β -АБ, не отмечено.

Заслуживает отдельного внимания опубликованный в 2018 г. метаанализ 11 РКИ, включивший 575 пациентов с промежуточной ФВ ЛЖ и 244 пациента с сохранной ФВ ЛЖ [19]. У больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ β -АБ по сравнению с плацебо не влияли на риск общей смертности (ОтнР=1,79, 95% ДИ: 0,78-4,10; $p=0,17$), сердечно-сосудистой смертности (ОтнР=1,77, 95% ДИ: 0,61-5,14; $p=0,29$), госпитализаций по сердечно-сосудистым причинам (ОтнР=0,66, 95% ДИ: 0,37-1,18; $p=0,16$), а также комбинированной конечной точки (сердечно-сосудистая смертность + госпитализации по сердечно-сосудистым причинам) (ОтнР=0,66, 95% ДИ: 0,38-1,15; $p=0,14$). У больных ХСН с промежуточной ФВ ЛЖ терапия β -АБ была ассоциирована со снижением риска сердечно-сосудистой смертности на 52% (ОтнР=0,48, 95% ДИ: 0,24-0,97; $p=0,04$). Таким образом, результаты метаанализа указывают на то, что β -АБ не влияют на прогноз у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, но могут быть эффективны при ХСН с промежуточной ФВ ЛЖ.

Данные исследований реальной клинической практики также противоречивы. Например, по данным F.M. Gomez-Soto и соавт., у 1085 больных ХСН со средней ФВ ЛЖ $58,7 \pm 3,2\%$ (из них 378 принимали бисопролол или карведилол) β -АБ снижали риск общей смертности на 63% (относительный риск (ОР)=0,37, 95% ДИ: 0,21-0,50), сердечно-сосудистой смертности на 69% (ОР=0,31, 95% ДИ: 0,18-0,45), а также частоту скорректированных по полу и возрасту госпитализаций (на 100 пациенто/лет) – 13,6 против 19,2 ($p < 0,001$) [20]. Однако следует отметить, что в группе β -АБ было больше пациентов с ишемической болезнью сердца или инсультом в анамнезе, хронической болезнью почек, дислипидемиями и курящих. В голландском исследовании (443 пациента с ХСН и ФВ ЛЖ $> 40\%$) также было выявлено снижение риска смерти на 43% (ОтнР=0,57, 95% ДИ: 0,37-0,88, $p=0,01$) [21]. В крупном шведском регистре ХСН у пациентов с сохранной ФВ ЛЖ β -АБ снижали риск смерти от всех причин всего на 7% (ОтнР=0,93, 95% ДИ: 0,86-0,996; $p=0,04$), но при этом не влияли на комбинированную конечную точ-

ку, включавшую смерть от всех причин и госпитализации по причине ХСН (ОтнР=0,98, 95% ДИ: 0,92-1,04; $p=0,46$) [22]. В то же время, по данным регистра OPTIMIZE-HF (4153 пациента с ХСН и ФВ ЛЖ $> 40\%$ после выписки из стационара) инициация терапии β -АБ не влияла на 1-летнюю смертность (ОтнР=0,94, 95% ДИ: 0,84-1,07), повторные госпитализации в течение 1 года (ОтнР=0,98, 95% ДИ: 0,90-1,06), а также на комбинированную точку, включавшую оба этих события (ОтнР=0,98, 95% ДИ: 0,91-1,06) [23]. По данным исследования CHS, среди 342 больных ХСН с ФВ ЛЖ $> 40\%$ применение β -АБ также не влияло на риск смерти от всех причин (ОтнР=0,56, 95% ДИ: 0,27-1,13) [24].

По данным метаанализа наблюдательных исследований и РКИ, опубликованного в 2016 г., β -АБ улучшали выживаемость больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ на 21% (ОР=0,79, 95% ДИ: 0,66-0,95) в 5 исследованиях с псевдорандомизацией ($n=12,315$) и на 30% (ОР=0,70, 95% ДИ: 0,52-0,94) в 6 исследованиях без псевдорандомизации ($n=15,275$), но не оказывали влияния на риск смерти (ОР=0,80, 95% ДИ: 0,61-1,05) в 3 РКИ ($n=1046$) [25]. Объединённый анализ показал, что в целом терапия β -АБ снижала риск смерти на 21% (ОР=0,79, 95% ДИ: 0,71-0,88).

Исследования также показали, что применение β -АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ не улучшает симптомы и качество жизни пациентов. Например, в исследовании ELANDD у пациентов с ФВ ЛЖ $> 45\%$, получавших небиволол, был выявлен меньший прирост дистанции в тесте 6-минутной ходьбы по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, при отсутствии различий по пиковому потреблению кислорода ($peakVO_2$) и качеству жизни [26]. В субанализе исследования CIBIS-ELD у больных ХСН с сохранной ФВ через 12 недель приема β -АБ (бисопролола или карведилола) также не было выявлено прироста дистанции в тесте 6-минутной ходьбы и улучшения качества жизни по сравнению с исходным уровнем [27].

Имеются данные, что использование β -АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ ассоциируется с повышением уровня НУП, а также не влияет на диастолическую функцию ЛЖ по данным эхокардиографии [18, 26-29]. Метаанализ 5 исследований, включивший 538 больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, не обнаружил влияния β -АБ на показатели тяжести ХСН (функциональный класс по NYHA, переносимость физической нагрузки, выраженную в метаболических эквивалентах, или уровень НУП в крови) по сравнению с контролем [30].

Таким образом, в большинство исследований включали больных ХСН с ФВ ЛЖ $> 40\%$, т.е. не только с сохранной, но и с промежуточной ФВ ЛЖ (согласно текущей классификации ХСН). При этом лишь в единичных работах анализировали только пациентов с ФВ ЛЖ $\geq 50\%$. Если в ряде исследований реаль-

ной клинической практики и мета-анализе таких исследований был продемонстрирован положительный эффект β -АБ при ХСН с ФВ ЛЖ >40%, то в РКИ и их метаанализах был выявлен либо незначительный положительный эффект, либо его отсутствие. В исследованиях с участием только пациентов с ФВ ЛЖ >50% показано либо отсутствие эффекта β -АБ, либо даже их негативное действие. Кроме этого, результаты исследований необходимо интерпретировать с осторожностью из-за возможного наличия заболеваний (например, перенесенного ранее инфаркта миокарда), при которых β -АБ могут существенно улучшать прогноз [31]. Исходя из вышеизложенного, депрескرایбинг β -АБ у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, не имеющих других показаний для их назначения, представляется актуальным направлением для дальнейшего изучения влияния β -АБ на состояние и прогноз пациентов.

Возможность депрескرایбинга бета-адреноблокаторов при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ

Депрескرایбинг – это практика запланированной контролируемой отмены, замены и снижения дозы лекарственных средств. Он рассматривается как один из методов борьбы с полипрагмазией. Как общая концепция депрескرایбинг может быть представлен в нескольких режимах:

1) Отмена препарата, которая может выполнена как одномоментно, так и в режиме постепенного понижения дозы (tapering).

2) Снижение дозы до минимально эффективной или до признанной "низкой" (по данным клинических исследований), также в режиме постепенного снижения дозы (tapering).

3) Замена на более безопасный класс препаратов.

К настоящему моменту опубликована всего одна работа, посвященная изучению отмены β -АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ. Это проспективное многоцентровое РКИ PRESERVE-HR, в которое включили 52 пациента со стабильной ХСН с ФВ ЛЖ >50% и хронотропной недостаточностью, принимавших β -АБ не менее 12 недель (наиболее назначаемый β -АБ – бисопролол в медианной дозе 2,5 мг) [32, 33]. Пациенты были рандомизированы в группу отмены β -АБ и в контрольную группу (продолжение приема β -АБ). Через 30 дней после рандомизации в группе отмены β -АБ оказались больше частота сердечных сокращений (ЧСС) при пиковой нагрузке (127 против 97 уд/мин; $p < 0,001$) и значения пикового потребления кислорода (14,3 против 12,2 мл/кг/мин, $p < 0,001$). Кроме этого, было отмечено улучшение суррогатных показателей качества жизни и уменьшение конечно-диастолического давления в ЛЖ по данным эхокардиографии, однако значимых изменений уровня НУП, других эхокардиографических маркеров или когнитивных параметров не обнаружили.

Какова целесообразность применения бета-адреноблокаторов у больных ХСН с сохранной ФВ?

Существует широко распространенное мнение, что фармакологическое снижение ЧСС приносит пользу больным ХСН с сохранной ФВ ЛЖ, поскольку снижение ЧСС способствует увеличению времени наполнения желудочков. Однако, экспериментальные данные не подтверждают эту точку зрения и свидетельствуют о том, что более низкая ЧСС за счет увеличения времени наполнения камер сердца увеличивает также давление наполнения и диастолическое напряжение на стенки ЛЖ, что усугубляет симптомы и снижает переносимость нагрузок [34]. Это может объяснить наблюдаемое в клинических исследованиях повышение уровня НУП и снижение толерантности к физической нагрузке у пациентов, получающих β -АБ [26, 29]. Польза более высокой ЧСС у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ была продемонстрирована в исследовании *муРАСЕ*, в которое включали пациентов с имплантированным кардиостимулятором [35]. Более высокая базовая частота стимуляции приводила к улучшению качества жизни пациентов, снижению уровня NT-proBNP через 1 мес. ($p = 0,02$) и увеличению физической активности через 6 мес. и 1 год ($p = 0,02$) по сравнению с контрольной группой.

Использование β -АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ может приводить к развитию хронотропной недостаточности. Хронотропная недостаточность определяется как неадекватное увеличение ЧСС во время физической нагрузки. По данным К. Smarz и соавт., хронотропная недостаточность была выявлена у 81% пациентов, принимающих β -АБ (среди которых 64% имели ХСН, из них более половины – ХСН с сохранной ФВ ЛЖ) [36]. При этом у пациентов, принимавших β -АБ, наличие хронотропной недостаточности ассоциировалось с более низкой переносимостью физической нагрузки независимо от дозы препарата. Однако, в небольшом исследовании, проведенном в клинике Mayo [37], у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ и хронотропной недостаточностью имплантация кардиостимулятора с целью увеличения ЧСС при физической нагрузке не приводила к улучшению переносимости физической нагрузки и была связана с увеличением частоты нежелательных явлений. Помимо этого, несмотря на то что воспаление и фиброз являются основными патогенетическими механизмами ХСН с сохранной ФВ ЛЖ [38], ряд авторов рассматривает повышенный тонус симпатической нервной системы как один из возможных механизмов развития ХСН с сохранной ФВ ЛЖ у некоторых пациентов [39, 40]. Соответственно, логично предположить, что у этой группы пациентов β -АБ могут быть полезны. Однако в этом случае необходимо соблюдение баланса между влиянием на тонус симпатической нервной системы и хронотропной

недостаточностью, развитию которой может способствовать прием β -АБ.

Заключение

Таким образом, применение β -АБ у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ и связанное с этим снижение ЧСС, вероятно, может оказывать негативное влияние на симптомы и качество жизни и приводить к увеличению частоты госпитализаций по поводу ХСН. К тому же, большинство имеющихся исследований не позволяют уверенно судить об эффективности β -АБ у больных ХСН с сохранной ФВ ЛЖ в виду того, что в них

также включали и пациентов с промежуточной ФВ ЛЖ и сопутствующими заболеваниями, для которых β -АБ улучшают прогноз.

В связи с вышесказанным требуется проведение хорошо спланированных исследований, направленных на изучение влияния β -АБ на симптомы и прогноз у больных ХСН с ФВ ЛЖ $\geq 50\%$ и на определение групп пациентов, которым эти средства могут быть полезны. Перспективы депрескрайбинга β -АБ при ХСН с сохранной ФВ ЛЖ также требуют дальнейшего изучения и проведения РКИ.

Отношения и Деятельность. Нет. Relationships and Activities. None.

References / Литература

1. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2022;145(18):e895-e1032. DOI:10.1161/CIR.0000000000001063.
2. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021;42(36):3599-3726. DOI:10.1093/eurheartj/ehab368.
3. 2020 Clinical practice guidelines for Chronic heart failure. *Russian Journal of Cardiology*. 2020;25(11):4083. (In Russ.) Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. DOI:10.15829/1560-4071-2020-4083.
4. Polyakov D. S., Fomin I.V., Belenkov Yu.N., et al. Chronic heart failure in the Russian Federation: what has changed over 20 years of follow-up? Results of the EPOCH-CHF study (in Russ.). *Kardiologiya*. 2021;61(4):4-14. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. *Кардиология*. 2021;61(4):4-14. DOI:10.18087/cardio.2021.4.n1628.
5. Drapkina O. M., Boytsov S.A., Omelyanovskiy V.V., et al. Socio-economic impact of heart failure in Russia. *Russian Journal of Cardiology*. 2021;26(6):4490. (In Russ.) Драпкина О.М., Бойцов С.А., Омеляновский В.В. и др. Социально-экономический ущерб, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, в Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4490. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4490.
6. Shah SJ, Borlaug BA, Kitzman DW, et al. Research Priorities for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: National Heart, Lung, and Blood Institute Working Group Summary. *Circulation*. 2020; 141(12):1001-1026. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041886.
7. Kittleson MM, Panjrath GS, Amancherla K, et al. 2023 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Management of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *J Am Coll Cardiol*. 2023;81(18):1835-1878. DOI:10.1016/j.jacc.2023.03.393.
8. Packer M, Bristow MR, Cohn JN, et al. The effect of carvedilol on morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. U.S. Carvedilol Heart Failure Study Group. *N Engl J Med*. 1996;334(21):1349-55. DOI:10.1056/NEJM199605233342101.
9. Packer M, Coats AJ, Fowler MB, et al; Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study Group. Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure. *N Engl J Med*. 2001;344(22):1651-8. DOI:10.1056/NEJM200105313442201.
10. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial. *Lancet*. 1999;353(9146):9-13. DOI:10.1016/S0140-6736(98)11181-9.
11. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF). *Lancet*. 1999;353:2001-7. DOI:10.1016/S0140-6736(99)04440-2.
12. Flather MD, Shibata MC, Coats AJ, et al; SENIORS Investigators. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). *Eur Heart J*. 2005;26(3):215-25. DOI:10.1093/eurheartj/ehi115.
13. Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS, et al; PARAGON-HF Investigators and Committees. Angiotensin-Nepriprysin Inhibition in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *N Engl J Med*. 2019;381(17):1609-1620. DOI:10.1056/NEJMoa1908655.
14. Yum B, Archambault A, Levitan EB, et al. Indications for β -Blocker Prescriptions in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *J Am Geriatr Soc*. 2019;67(7):1461-1466. DOI:10.1111/jgs.15977.
15. Musse M, Lau JD, Yum B, et al. Physician Perspectives on the Use of Beta Blockers in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *Am J Cardiol*. 2023;193:70-74. DOI:10.1016/j.amjcard.2023.01.050.
16. Yamamoto K, Origasa H, Hori M; J-DHF Investigators. Effects of carvedilol on heart failure with preserved ejection fraction: the Japanese Diastolic Heart Failure Study (J-DHF). *Eur J Heart Fail*. 2013;15(1):110-8. DOI:10.1093/eurjhf/hfs141.
17. van Veldhuisen DJ, Cohen-Solal A, Böhm M, et al; SENIORS Investigators. Beta-blockade with nebivolol in elderly heart failure patients with impaired and preserved left ventricular ejection fraction: Data From SENIORS (Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalization in Seniors With Heart Failure). *J Am Coll Cardiol*. 2009;53(23):2150-8. DOI:10.1016/j.jacc.2009.02.046.
18. Silverman DN, Plante TB, Infeld M, et al. Association of β -Blocker Use With Heart Failure Hospitalizations and Cardiovascular Disease Mortality Among Patients With Heart Failure With a Preserved Ejection Fraction: A Secondary Analysis of the TOPCAT Trial. *JAMA Netw Open*. 2019;2(12):e1916598. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2019.16598.
19. Cleland JGF, Bunting KV, Flather MD, et al; Beta-blockers in Heart Failure Collaborative Group. Beta-blockers for heart failure with reduced, mid-range, and preserved ejection fraction: an individual patient-level analysis of double-blind randomized trials. *Eur Heart J*. 2018;39(1):26-35. DOI:10.1093/eurheartj/ehx564.
20. Gomez-Soto FM, Romero SP, Bernal JA, et al. Mortality and morbidity of newly diagnosed heart failure with preserved systolic function treated with β -blockers: a propensity-adjusted case-control populational study. *Int J Cardiol*. 2011;146(1):51-5. DOI:10.1016/j.ijcard.2009.06.009.
21. Dobre D, van Veldhuisen DJ, DeJongste MJ, et al. Prescription of beta-blockers in patients with advanced heart failure and preserved left ventricular ejection fraction. Clinical implications and survival. *Eur J Heart Fail*. 2007;9(3):280-6. DOI:10.1016/j.ejheart.2006.07.008.
22. Lund LH, Benson L, Dahlström U, et al. Association between use of β -blockers and outcomes in patients with heart failure and preserved ejection fraction. *JAMA*. 2014;312(19):2008-18. DOI:10.1001/jama.2014.15241.
23. Hernandez AF, Hammill BG, O'Connor CM, et al. Clinical effectiveness of betablockers in heart failure: findings from the OPTIMIZE-HF (Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure) Registry. *J Am Coll Cardiol*. 2009;53(2):184-92. DOI:10.1016/j.jacc.2008.09.031.
24. Chan JD, Rea TD, Smith NL, et al. Association of beta-blocker use with mortality among patients with congestive heart failure in the Cardiovascular Health Study (CHS). *Am Heart J*. 2005;150(3):464-70. DOI:10.1016/j.ahj.2004.12.022.
25. Fukuta H, Goto T, Wakami K, Ohte N. The effect of beta-blockers on mortality in heart failure with preserved ejection fraction: A meta-analysis of observational cohort and randomized controlled studies. *Int J Cardiol*. 2017;228:4-10. DOI:10.1016/j.ijcard.2016.11.239.
26. Conraads VM, Metra M, Kamp O, et al. Effects of the long-term administration of nebivolol on the clinical symptoms, exercise capacity, and left ventricular function of patients with diastolic dysfunction: results of the ELANDD study. *Eur J Heart Fail*. 2012;14(2):219-25. DOI:10.1093/eurjhf/hfr161.
27. Edelmann F, Musial-Bright L, Gelbrich G, et al; CIBIS-ELD Investigators and Project Multicenter Trials in the Competence Network Heart Failure. Tolerability and Feasibility of Beta-Blocker Titration in HFpEF Versus HFrEF: Insights From the CIBIS-ELD Trial. *JACC Heart Fail*. 2016;4(2):140-149. DOI:10.1016/j.jchf.2015.10.008.
28. Harada E, Mizuno Y, Ishii M, et al. β -Blockers are associated with increased B-type natriuretic peptide levels differently in men and women in heart failure with preserved ejection fraction. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2022;323(2):H276-H284. DOI:10.1152/ajpheart.00029.2022.

29. Bergström A, Andersson B, Edner M, et al. Effect of carvedilol on diastolic function in patients with diastolic heart failure and preserved systolic function. Results of the Swedish Doppler-echocardiographic study (SWEDIC). *Eur J Heart Fail.* 2004;6(4):453-61. DOI:10.1016/j.ejheart.2004.02.003.
30. Fukuta H, Goto T, Wakami K, et al. Effect of beta-blockers on heart failure severity in patients with heart failure with preserved ejection fraction: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Heart Fail Rev.* 2021;26(1):165-171. DOI:10.1007/s10741-020-10013-5
31. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2020;41(3):407-477. DOI:10.1093/eurheartj/ehz425.
32. Palau P, Seller J, Domínguez E, et al. Beta-blockers withdrawal in patients with heart failure with preserved ejection fraction and chronotropic incompetence: Effect on functional capacity rationale and study design of a prospective, randomized, controlled trial (The Preserve-HR trial). *Clin Cardiol.* 2020;43(5):423-429. DOI:10.1002/clc.23345.
33. Palau P, Seller J, Domínguez E, et al. Effect of β -Blocker Withdrawal on Functional Capacity in Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. *J Am Coll Cardiol.* 2021;78(21):2042-2056. DOI:10.1016/j.jacc.2021.08.073.
34. Colin P, Ghaleh B, Hittinger L, et al. Differential effects of heart rate reduction and beta-blockade on left ventricular relaxation during exercise. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2002;282(2):H672-9. DOI:10.1152/ajpheart.00547.2001.
35. Infeld M, Wahlberg K, Cicero J, et al. Effect of Personalized Accelerated Pacing on Quality of Life, Physical Activity, and Atrial Fibrillation in Patients With Preclinical and Overt Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The myPACE Randomized Clinical Trial. *JAMA Cardiol.* 2023;8(3):213-221. DOI:10.1001/jamacardio.2022.5320.
36. Smarz K, Tysarowski M, Zaborska B, et al. Chronotropic Incompetence Limits Aerobic Exercise Capacity in Patients Taking Beta-Blockers: Real-Life Observation of Consecutive Patients. *Healthcare (Basel).* 2021;9(2):212. DOI:10.3390/healthcare9020212.
37. Reddy YNV, Koepp KE, Carter R, et al. Rate-Adaptive Atrial Pacing for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The RAPID-HF Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2023;329(10):801-809. DOI:10.1001/jama.2023.0675.
38. Ageev F.T., Ovchinnikov A.G. Diastolic heart failure: 20 years later. Current issues of pathogenesis, diagnosis and treatment of heart failure with preserved LVEF. *Kardiologiya.* 2023;63(3):3-12. (In Russ.). Areev Ф.Т., Овчинников А.Г. Диастолическая сердечная недостаточность: 20 лет спустя. Актуальные вопросы патогенеза, диагностики и лечения сердечной недостаточности с сохраненной ФВ ЛЖ. *Кардиология.* 2023;63(3):3-12. DOI:10.18087/cardio.2023.3.n2376.
39. Kaye DM, Nanayakkara S, Wang B, et al. Characterization of Cardiac Sympathetic Nervous System and Inflammatory Activation in HFpEF Patients. *JACC Basic Transl Sci.* 2022;7(2):116-127. DOI:10.1016/j.jacbt.2021.11.007.
40. Bengel FM. Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Nerve-Wrecking Condition. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2022;15(4):669-671. DOI:10.1016/j.jcmg.2022.01.002.

Сведения об Авторах/About the Authors

Закиев Вадим Дмитриевич [Vadim D. Zakiev]

eLibrary SPIN 3631-6708, ORCID 0000-0003-4027-3727

Воробьева Наталья Михайловна [Natalya M. Vorobyeva]

eLibrary SPIN 3269-1397, ORCID 0000-0002-6021-7864

Малая Ирина Павловна [Irina P. Malaya]

eLibrary SPIN 7839-8835, ORCID 0000-0001-5964-5725

Гвоздева Анна Дмитриевна [Anna D. Gvozdeva]

eLibrary SPIN 6274-2097, ORCID 0000-0002-5684-9842

Ткачёва Ольга Николаевна [Olga N. Tkacheva]

eLibrary SPIN 6129-5809, ORCID 0000-0002-4193-688X