



ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги !

Перед Вами второй в 2007 году номер научно-практического рецензируемого журнала для кардиологов и терапевтов «Рациональная фармакотерапия в кардиологии». Основная направленность номера – актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Открывает номер статья В.А. Шульмана и соавторов, посвященная проблеме разрывов сердца при инфаркте миокарда. Представлены результаты 15-летних наблюдений; показано, что адекватный контроль АД и ЧСС имеет большое значение для профилактики разрывов сердца.

Оригинальные исследования в основном посвящены ИБС и артериальной гипертензии. Ю.В. Гаврилов и соавторы провели сравнительное исследование антиангинальной и антиишемической эффективности небиволола и метопролола у больных стабильной стенокардией. Обнаружено, что небиволол более эффективно, по сравнению с метопрололом, уменьшает количество эпизодов «немой» ишемии миокарда. И.И. Синицина с соавторами изучили антиангинальную и антиишемическую активность молсидомина при стабильной стенокардии II-III функционального класса. Показано, что молсидомин уменьшает частоту приступов стенокардии и повышает толерантность к физической нагрузке у больных стенокардией.

Н.Э. Закирова и коллеги продемонстрировали взаимосвязь выраженности иммуновоспалительных реакций от тяжести функционального класса стенокардии у больных ИБС.

Н.П. Кутишенко и соавторы оценили терапевтическую эквивалентность оригинального индапамида и индапамида-дженерика у больных артериальной гипертензией. Проведено рандомизированное перекрестное исследование. Оказалось, что статистически значимых различий в эффективности и безопасности препаратов нет.

Л.И. Кательническая и коллеги продемонстрировали взаимосвязь неблагоприятной экологической обстановки в Ростове-на-Дону с развитием гипертонической болезни и хронического обструктивного бронхита. М.М. Батюшин и соавторы на основании собственных данных представляют возможности повышения эффективности терапии больных с рефрактерной артериальной гипертензией. Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных хроническим легочным сердцем с помощью антагонистов рецепторов ангиотензина II – предмет исследования В.С. Задионченко и соавторов.

Актуальная проблема – артериальная гипертензия в сочетании с ожирением – рассмотрена в статье Н. Н. Никитиной и соавторов. Авторы оценили влияние агониста имидазолиновых рецепторов рилменидина на суточный профиль АД и активность симпатической нервной системы у молодых больных с артериальной гипертензией и обнаружили, что рилменидин наиболее эффективен у пациентов с сопутствующим ожирением.

Рубрику «Актуальные вопросы клинической фармакологии» открывает обзор К.С. Лексиной и соавторов, в котором представлены данные о роли оксидативного стресса в развитии ишемии миокарда, реперфузионного синдрома, эндотелиальной дисфункции, атерогенеза у больных сахарным диабетом 2 типа.

Статья Д.А. Сычева и коллег, посвящена принципиально новому методу дозирования варфарина – фармакогенетическому тестированию. Авторы анализируют алгоритмы дозирования варфарина, разработанные на основе этого метода.

В рубрике «Точка зрения» представлена статья Д.В. Небиеридзе, посвященная метаболическим и сосудистым эффектам антагонистов кальция. Особое внимание автор уделяет урежающим ритм антагонистам кальция, их влиянию на функцию эндотелия.

В этом номере журнала публикуются рекомендации Американской коллегии кардиологов, Американской ассоциации кардиологов и Европейского общества кардиологов по ведению больных с фибрилляцией предсердий. Комментарий к рекомендациям написал эксперт в этой области, профессор С.Р. Гиляревский.

В заключение хотел бы призвать авторов к активному сотрудничеству с журналом «Рациональная фармакотерапия в кардиологии».

С уважением,

Главный редактор
Академик РАМН, профессор П.Г. Оганов